

## **CABRELA**

Código: PT043

Alentejo: Alcácer do Sal (Setúbal), Montemor-o-Novo, Viana do Alentejo (Évora)

Coordenadas geográficas: 38°29'N 08°22'W

Área: 56.554 ha

Altitudes:

### **Critérios**

A1 (*Tetrax tetrax*)

A3 (*Caprimulgus ruficollis*, *Oenanthe hispanica*, *Sylvia cantillans*, *Sylvia melanocephala*, *Sturnus unicolor*)

C1 (*Tetrax tetrax*)

C6 (*Hieraaetus fasciatus*, *Elanus caeruleus*, *Chlydonias hybridus*)

### **Descrição do sítio**

O Sítio de Cabrela apresenta uma enorme diversidade de habitats ainda em bom estado de conservação, que se traduz numa riqueza específica muito elevada no que respeita à avifauna. Nesta área predominam os montados de sobreiro, de azinheira e montados mistos de azinheiras e sobreiros. Nas encostas acentuadamente declivosas existem azinhais e medronhais. As galerias ripícolas encontram-se, em geral, em bom estado de conservação, existindo ainda alguns açudes com vegetação aquática e ribeirinha bem desenvolvida.

**Habitats:** Florestas e matas (floresta com espécies de folha persistente), Matos (matos esclerófilos), Zonas húmidas (cursos de água; águas doces paradas; vegetação ribeirinha), Zonas artificiais (terra arada)

**Uso do solo:** agricultura; pastorícia; subercultura; silvicultura; pesca; caça

### **Importância ornitológica**

Nos açudes podem observar-se regularmente quase todas as espécies de aves aquáticas existentes no país, incluindo: o Mergulhão-de-poupa (*Podiceps cristatus*), o Garçote (*Ixobrychus minutus*), a Garça-vermelha (*Ardea purpurea*) e a Cegonha-preta (*Ciconia nigra*), para além das espécies referidas na Tabela. A comunidade de rapinas, diurnas e nocturnas, é igualmente ampla e importante em qualidade e quantidade. A grande diversidade de habitats permite uma boa representatividade das espécies características do bioma Mediterrânico. Nas áreas de estepe cerealífera o Sisão *Tetrax tetrax* ocorre em grande densidade durante o período reprodutor, e a Abetarda *Otis tarda* ocorre regularmente no período pós-reprodutor (pelo menos cerca de 10 indivíduos). Observações recentes de alguns Francelhos *Falco naumanni* durante o período reprodutor sugerem que a área poderá também ser importante para esta espécie globalmente ameaçada.

Espécie	Época	Ano	Min	Máx	Rigor	Critérios
<i>Hieraaetus fasciatus</i> Águia-perdigueira	N	2001	1	3	A	C6
<i>Elanus caeruleus</i> Peneireiro-cinzento	N	2001	8	10	A	C6
<i>Chlydonias hybridus</i> Gaivina-dos-pauis	N	2000	rara		-	C6
<i>Tetrax tetrax</i> Sisão	N	2002	100i	-	-	A1, C1
<i>Caprimulgus ruficollis</i> Noitibó-de-nuca-vermelha	N	2001	comum		-	A3
<i>Oenanthe hispanica</i> Chasco-ruivo	N	2001	Pouco comum		-	A3
<i>Sylvia cantillans</i> Toutinegra-tomilheira	N	2001	Pouco comum		-	A3
<i>Sylvia melanocephala</i> Toutinegra-dos-valados	R	2001	comum		-	A3
<i>Sturnus unicolor</i> Estorninho-preto	R	2001	comum		-	A3

### **Protecção legal**

**Nacional:** SIC Cabrela (Resolução de Conselho de Ministros n° 142/97, de 28 de Agosto).

Internacional: SIC Cabrela.

**Conservação**

Não existe qualquer plano de gestão para o sítio Natura 2000, mas foi feita uma proposta de plano de gestão através de um projecto LIFE, sobretudo direccionada para os habitats e espécies de flora e fauna prioritárias.

Ameaças: agricultura; urbanização; perturbação; florestação intensiva; caça ilegal; turismo náutico.