

CAPELINHOS

Código: PT054 (parte da antiga QQ003)
Açores: Horta
Coordenadas geográficas: 38°36'N 28°47'W
Área: 215 ha
Altitudes: 0-300m

Critérios

A4i (*Sterna dougallii*)
A4ii (*Calonectris diomedea*)
B1i (*Sterna dougallii*)
B1ii (*Calonectris diomedea*)
B2 (*Calonectris diomedea*, *Puffinus assimilis*, *Sterna dougallii*)
C2 (*Calonectris diomedea*, *Sterna dougallii*)

Descrição do sítio

A IBA compreende duas zonas: a zona dos Capelinhos-Ponta da Fajã, que se estende ao longo da linha de costa, desde a beira mar até ao rebordo da falésia, com início no Porto dos Capelinhos e fim no Porto da Fajã; e a zona do Vulcão dos Capelinhos, constituída por um cone vulcânico costeiro, uma praia de areia e falésias de costa rochosa adjacente. A erupção deste vulcão submarino é a mais recente dos Açores (1957-1958) e esta área possui uma grande diversidade geomorfológica e locais ainda em evolução, caso das areias vulcânicas e dos fundos marinhos. Os habitats naturais da zona envolvente do vulcão são essencialmente caracterizados por vegetação vivaz das costas de calhaus rolados, falésias com vegetação das costas macaronésicas, campos de lavas e escavações naturais. A zona da Ribeira das Cabras é também uma zona ao longo da falésia alta, que apresenta algum mato macaronésico endémico, vegetação vivaz das costas de calhau rolado e falésias com vegetação das costas macaronésicas.

Habitats: matos (matos macaronésicos), áreas rochosas (falésias rochosas, ilhéus rochosos, áreas com cascalho), vegetação exótica/introduzida

Uso do solo: conservação da natureza e investigação; turismo/recreio; sem utilização

Importância ornitológica

Esta zona é particularmente importante para as aves marinhas nidificantes, com destaque para a Cagarra *Calonectris diomedea* e a Gaivina-rosada *Sterna dougallii*.

| Espécie | Época | Ano | Min | Máx | Rigor | Critérios |
|---|-------|------|-------|------|-------|--------------------|
| <i>Calonectris diomedea</i> Cagarra | N | 2001 | 5773 | 5773 | B | A4ii, B1ii, B2, C2 |
| <i>Sterna dougallii</i> Gaivina-rosada | N | 2000 | 138 | 138 | A | A4i, B1i, B2, C2 |
| <i>Serinus canaria</i> Canário-da-terra | R | 1996 | comum | | - | B3 |

Protecção legal

Nacional: Área Protegida Vulcão dos Capelinhos/Reserva Florestal Natural dos Capelinhos

Internacional: ZPE Caldeira e Capelinhos; SIC Caldeira e Capelinhos.

Conservação

Os predadores terrestres introduzidos (cães e gatos ferais, ratos e furões) limitam provavelmente a nidificação da maioria das aves marinhas. Em 1998 foi detectada a predação por gatos ferais na colónia mista de gaivinas existente nos Capelinhos, o seu impacto foi de tal forma que no ano seguinte apenas 2 casais de Gaivina-comum nidificaram nesta colónia. A captura de Cagarra e de outros procelariformes ocorre em pequena escala. A invasão por plantas exóticas, como a Cana *Arundo donax*, resultou na perda de habitat de nidificação disponível para os procelariformes. A perturbação humana causada por actividades de lazer não autorizadas causa forte perturbação junto das colónias de *Sterna* sp. A ausência de protecção das ZPE por diploma legal diminui a

eficácia de medidas minimizadoras dos impactos e da vigilância existente. Encontra-se em fase de finalização um plano de gestão para a ZPE da “Costa Nordeste”.

Ameaças: Introdução de plantas/animais (A), Perturbação (A), Recreio/Turismo (A), Exploração não sustentável (C).

Referências

Del Nevo *et al.* (1990), Monteiro & Groz (1999), Monteiro *et al.* (1998, 1999, inédito), Pereira *et al.* (2000), Rodrigues & Nunes (2002)