

RIBEIRINHA

Código: PT056

Açores: Horta

Coordenadas geográficas: 38°37'N 28°38'W

Área: 91 ha

Altitudes: 0-190 m

Critérios

A4i (*Sterna dougallii*)

A4ii (*Calonectris diomedea*)

B1i (*Sterna dougallii*)

B1ii (*Calonectris diomedea*)

B2 (*Calonectris diomedea*, *Sterna dougallii*)

C2 (*Calonectris diomedea*, *Sterna dougallii*)

Descrição do sítio

A IBA segue ao longo da costa numa faixa que vai desde a beira mar até ao rebordo da falésia, com muitas reentrâncias e zonas argilosas, além de algum calhau rolado. Os habitats representados são os matos macaronésicos endémicos, a vegetação vivaz das costas de calhau rolado, e vegetação das costas macaronésicas.

Habitats: matos (matos macaronésicos), áreas rochosas (falésias rochosas, áreas com cascalho); vegetação exótica/introduzida

Uso do solo: sem utilização

Importância ornitológica

Esta zona é importante para as aves marinhas nidificantes.

Espécie	Época	Ano	Min	Máx	Rigor	Critérios
<i>Calonectris diomedea</i> <i>Caçarra</i>	N	2001	3688	3688	B	A4ii, B1ii, B2, C2
<i>Sterna dougallii</i> <i>Gaivina-rosada</i>	N	2000	46	46	A	A4i, B1i, B2, C2

Protecção legal

Nacional: nenhuma

Internacional: nenhuma

Conservação

Os predadores terrestres introduzidos (cães e gatos ferais, ratos e furões) limitam provavelmente a nidificação da maioria das aves marinhas. A invasão por plantas exóticas, como a Cana *Arundo donax*, resultou na perda de habitat de nidificação disponível para os procelarifórmes. A perturbação humana causada por actividades de lazer não autorizadas causa forte perturbação e destruição do habitat.

Ameaças: Introdução de plantas/animais (B), Perturbação (B), Fenómenos naturais (B).

Referências

Del Nevo *et al.* (1990), Monteiro & Groz (1999), Monteiro *et al.* (1998, 1999, inédito), Pereira *et al.* (2000), Rodrigues & Nunes (2002)