

## **ILHÉU DE BAIXO E COSTA ADJACENTE**

Código: PT059 (antiga QQ007)  
Açores: Santa Cruz da Graciosa  
Coordenadas geográficas: 39°01'N 27°57'W  
Área: 74 ha  
Altitudes: 0-150 m

### **Critérios**

A4i (*Sterna dougallii*)  
A4ii (*Calonectris diomedea*, *Oceanodroma castro*)  
B1i (*Sterna dougallii*)  
B1ii (*Calonectris diomedea*, *Puffinus assimilis*, *Oceanodroma castro*)  
B2 (*Bulweria bulwerii*, *Puffinus assimilis*, *Oceanodroma castro*, *Sterna dougallii*)  
C2 (*Calonectris diomedea*, *Puffinus assimilis*, *Oceanodroma castro*, *Sterna dougallii*)  
C6 (*Bulweria bulwerii*, *Oceanodroma castro*)

### **Descrição do sítio**

A IBA inclui uma parte da faixa costeira na zona do Carapacho e do farol da Restinga. O habitat é essencialmente constituído por falésias com vegetação das costas macaronésicas e vegetação vivaz das costas de calhaus rolados. A IBA compreende uma faixa desde a beira mar até ao rebordo da falésia. Inclui o Ilhéu de Baixo, cuja vegetação é constituída essencialmente por vegetação vivaz de calhaus rolados e nas falésias por vegetação das costas macaronésicas.

Habitats: matos (matos macaronésicos), áreas rochosas (falésias rochosas, ilhéus rochosos, áreas com cascalho), vegetação exótica/introduzida

Uso do solo: Conservação da natureza e investigação, Turismo/recreio

### **Importância ornitológica**

Esta zona é particularmente importante para as aves marinhas nidificantes, incluindo uma das maiores concentrações de Roquinho *Oceanodroma castro* nos Açores e uma importante colónia de Gaivina-rosada *Sterna dougallii*. No Ilhéu de Baixo nidificam duas populações distintas em dois períodos distintos do ano.

| Espécie                                | Época | Ano  | Min  | Máx  | Rigor | Critérios              |
|--|-------|------|------|------|-------|------------------------|
| <i>Calonectris diomedea</i> Cagarra    | N     | 2001 | 2463 | 2463 | B     | A4ii, B1ii, C2         |
| <i>Puffinus assimilis</i> Pintainho    | N     | 1997 | 50   | 50   | B     | B1ii, B2, C2           |
| <i>Oceanodroma castro</i> Roquinho     | N     | 1997 | 300  | 300  | B     | A4ii, B1ii, B2, C2, C6 |
| <i>Sterna dougallii</i> Gaivina-rosada | N     | 2000 | 163  | 163  | A     | A4i, B1i, B2, C2, C6   |

### **Protecção legal**

Nacional: nenhuma

Internacional: ZPE Ilhéu de Baixo; SIC Ilhéu de Baixo e Restinga.

### **Conservação**

O Ilhéu de Baixo encontra-se sob pressão reduzida das actividades de recreio da população local. Juvenis e adultos de Cagarra *Calonectris diomedea* são regularmente capturados pelos pescadores. Na zona costeira, os predadores terrestres introduzidos (cães e gatos ferais, ratos e mustelídeos) limitam provavelmente a nidificação da maioria das aves marinhas, especialmente os procelariformes mais pequenos e mais vulneráveis que nidificam em cavidades no solo ou no cascalho. A invasão por plantas exóticas, como a Cana *Arundo donax*, resultou na perda de habitat de nidificação disponível para os procelariformes. A ausência de diploma legal das ZPE por diploma legal nacional/regional diminui a eficácia de medidas minimizadoras dos impactos e da vigilância existente. Encontra-se em fase de finalização um plano de gestão para a ZPE Ilhéu de Baixo.

Ameaças: Introdução de plantas/animais (B), Perturbação (B), Recreio/turismo (A).

**Referências**

Del Nevo *et al.* (1990), Monteiro & Groz (1999), Monteiro *et al.* (1998, 1999, inédito), Pereira *et al.* (2000), Rodrigues & Nunes (2002)