

## **ILHÉU DA VILA**

Código: PT068 (antiga QQ014)  
Açores: Vila do Porto  
Coordenadas geográficas: 36°56'N 25°10'W  
Área: 8 ha  
Altitudes: 0-52 m

### **Critérios**

A4i (*Sterna dougallii*)  
A4ii (*Oceanodroma castro*)  
B1i (*Sterna dougallii*)  
B1ii (*Puffinus assimilis*, *Oceanodroma castro*)  
B2 (*Bulweria bulwerii*, *Puffinus assimilis*, *Oceanodroma castro*, *Sterna dougallii*)  
C2 (*Calonectris diomedea*, *Puffinus assimilis*, *Oceanodroma castro*, *Sterna dougallii*, *Sterna hirundo*)  
C6 (*Bulweria bulwerii*, *Oceanodroma castro*, *Sterna dougallii*, *Sterna hirundo*)

### **Descrição do sítio**

O Ilhéu da Vila é um ilhéu rochoso de basalto, com acentuados declives e falésias. No seu topo e nas falésias a rocha é coberta por solo, que alberga plantas anuais características das comunidades costeiras dos Açores e de entre as quais se destacam as espécies *Lotus azoricus*, *Myosotis maritima* e *Spergularia azorica*. O ilhéu é desabitado, sendo no entanto visitado regularmente por pescadores e ocasionalmente pelos turistas. O ilhéu foi usado para criar gado até 1993. No primeiro inventário das IBAs este sítio incluía a costa adjacente, mas presentemente este sector não suporta números de aves que justifiquem a classificação de acordo com os critérios revistos.

Habitats: Prados, áreas rochosas (falésias rochosas, ilhéus rochosos, áreas com cascalho)

Uso do solo: Conservação da natureza e investigação, Turismo/recreio

### **Importância ornitológica**

Esta zona é particularmente importante para as aves marinhas, reunindo todas as espécies que nidificam regularmente nos Açores, excepto Fura-bucho do Atlântico *Puffinus puffinus*. É o único local conhecido de nidificação de Alma-negra *Bulweria bulwerii* nos Açores, embora existam registos de ocorrência desta espécie noutras zonas. A mesma situação ocorre com a Gaivina-de-dorso-preto *Sterna fuscata*, constituindo, juntamente com as Selvagens, no Arquipélago da Madeira, os únicos locais conhecidos de nidificação da espécie na Europa. Em alguns anos, nidificou também neste ilhéu a maior colónia de Gaivina-comum *Sterna hirundo* dos Açores.

Espécie	Época	Ano	Min	Máx	Rigor	Critérios
<i>Bulweria bulwerii</i> Alma-negra	N	1997	50	50	B	B2, C6
<i>Puffinus assimilis</i> Pintainho	N	1997	50	50	B	B1ii, B2, C2
<i>Oceanodroma castro</i> Roquinho	N	1997	150	250	B	A4ii, B1ii, B2, C6
<i>Sterna dougallii</i> Gaivina-rosada	N	2000	236	236	A	A4i, B1i, B2, C2, C6
<i>Sterna hirundo</i> Gaivina	N	2000	1025	1025	A	

### **Protecção legal**

Nacional: nenhuma

Internacional: ZPE Ilhéu da Vila e Costa Adjacente

### **Conservação**

As cabras foram erradicadas do ilhéu em 1993. Os juvenis e adultos de Cagarra *Calonectris diomedea* são regularmente capturados pelos pescadores. No Ilhéu da Vila têm sido conduzidos estudos sobre a ecologia de aves marinhas, e encontra-se em fase de finalização um plano de gestão para a ZPE Ilhéu da Vila e Costa Adjacente. A ausência de diploma legal das ZPE por diploma legal

nacional/regional diminui a eficácia de medidas minimizadoras dos impactos e da vigilância existente.

Ameaças: Perturbação das aves (A), turismo/recreio (B)

### **Referências**

Del Nevo *et al.* (1990), Monteiro & Groz (1999), Monteiro *et al.* (1998, 1999, inédito), Pereira *et al.* (2000), Rodrigues & Nunes (2002)